

AZIATISCHE OLIFANT



NEDERLANDSE NAAM

Aziatische olifant

FRANSE NAAM

Éléphant d'Asie

ENGELSE NAAM

Asian elephant

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Elephas maximus

AZIATISCHE OLIFANTEN ...

- zijn meestal kleiner dan Afrikaanse olifanten, hebben kleinere oren en soms pigmentloze vlekken.
- hebben een bolle rug (bij Afrikaanse hol), één vinger aan het uiteinde van de slurf (Afrikaanse twee).
- hebben 5 nagels aan de voorpoten (Afrikaanse savanneolifant 4, de bosolifant 5).
- hebben een minder gerimpelde huid dan Afrikaanse olifanten.
- gebruiken hun slurf om te drinken en water te spuiten, om dingen te manipuleren - van boomstam tot gepelde pindanoten - en als slagwapen. De slurf van de olifant is een combinatie van de neus en bovenlip en telt meer dan 150.000 spiertjes.

KENMERKEN

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| • Klasse: | zoogdieren |
| • Orde: | slurfdieren |
| • Familie: | olifantachtigen |
| • Grootte: | 550 - 640 cm |
| • Schofthoogte: | ♂ 270 - 340 cm
♀ 240 - 250 cm |
| • Gewicht: | ♂ 3600 - 6000 kg
♀ 2720 - 4160 kg |
| • Max. leeftijd: | Meer dan 60 jaar |
| • Lengte staart: | 120 - 150 cm |

VERSPREIDINGSGEBIED

Bangladesh, Bhutan, Cambodja, China, India, Indonesië, Maleisië, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand en Vietnam.

De Aziatische olifant komt nog voor in 15% van zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied. 60% van de populatie vind je in India.

BIOTOOP

Hij komt voornamelijk voor in bossen (droog en vochtig) en graslanden. Ook bij rivieren en bergbossen is hij te vinden.



VERSPREIDINGSGEBIED
AZIATISCHE OLIFANT

VOEDING

Een olifant is een **niet-herkauwende herbivoor**. Aziatische olifanten eten zachter voedsel dan de Afrikaanse. Ze eten onder andere grassen, bladeren, twijgen en schors. Ze zijn **14 tot 19 uur** bezig met **foerageren en verorberen 100 tot 150 kg** per dag.

Olifanten hebben dagelijks nood aan drinkwater. Ze drinken meer dan **100 l per dag**. Als ze niet kunnen gaan drinken aan een rivier of meer, gaan ze graven naar water. Hier profiteren dan ook andere dieren van.

VOORTPLANTING

De jongen worden geboren na een **draagtijd** van **22 maanden**. Meestal wordt **één jong** geboren, een enkele keer een tweeling en in heel zeldzame gevallen een drieling. Pasgeboren dieren wegen **80 - 110 kg** en hebben een schouderhoogte van ongeveer **1 m**. Na 20 min staat het kalfje recht en binnen het uur wandelt het mee met de kudde.

Kalveren drinken enkel **melk** tot ze **3 maanden** oud zijn en worden gezoogd tot ze 4 jaar zijn of tot er een nieuw kalfje wordt geboren.

Een kalf blijft de eerste **4 tot 8 jaar** dicht bij de moeder. Een jonge bul blijft bij de kudde waarin hij geboren is tot hij ongeveer **10 jaar** oud is, al gebeurt het ook dat ze vanaf **6 jaar 'volwassen'** zijn en de kudde verlaten.

Een olifantenkoe kan elke 4 tot 6 jaar een jong krijgen. In haar hele leven, dat 60 tot 70 jaar kan duren, kan ze ongeveer **7 jongen** krijgen.

BEDREIGD

De populatie van de Aziatische olifant is volgens een recente schatting op 40.000 à 50.000 dieren geraamd. Zoals bij heel veel bedreigde diersoorten is ook hier het verlies van geschikte woongebieden door fragmentatie en door de alsmaar groeiende menselijke populaties, een grote zorg. Omdat olifanten enkel al door hun grootte enorme hoeveelheden voedsel nodig hebben, zijn zij de eerste die lijden onder de bovenstaande factoren. Olifanten kunnen niet overleven in

door landbouw gedomineerde gebieden. Dit leidt tot steeds meer conflictsituaties.

Stropen is ook een belangrijke factor in de achteruitgang van de Aziatische olifant. Er wordt op hen gejaagd voor het ivoor ook al hebben ze veel kleinere slag tanden dan de Afrikaanse olifant, maar ook voor andere producten zoals vlees en leder. Het doden van mannetjes voor de slag tanden heeft als gevolg dat in sommige gebieden de verhouding mannetjes/vrouwtjes volledig verstoord is wat de genetische variatie niet ten goede komt.

EEP

Het Europese kweekprogramma wordt beheerd door Blijddorp in Rotterdam. Het EEP of European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén

dierentuin coördineert het kweekprogramma.

AZIATISCHE OLIFANTEN ...

- wisselen ook hun kiezen, tot zes keer in hun leven. De kleinere tanden worden naar voren geduwd, vallen uit en worden vervangen door grotere kiezen die erachter stonden.
- slapen 3 à 4 uur per dag.
- zijn zeer goede zwemmers. Hun slurf doet dan dienst als snorkel.
- hebben een musthklie, zowel de koeien als de bullen. Deze klie ligt aan beide kanten van de kop, tussen oog en oor. De (uitscheiding van de) musthklie is vooral zichtbaar bij de bul tijdens de 'musth'. Dit is een periode van verhoogde seksuele activiteit en agressief gedrag.
- hebben, alleen de mannetjes, (grote) slag tanden. Sommige vrouwtjes hebben kleine, soms zichtbare, stompjes (tushes).



IUCN-status
BEDREIGD