KLEMMERS DAGGEKKO

NEDERLANDSE NAAM
Klemmers daggekko

FRANSE NAAM
Gecko diurne de Klemmer

ENGELSE NAAM
Klemmer's day gecko

WETENSCHAPPELIJKE NAAM
Phelsuma klemmeri

KLEMMERS DAGGEKKO'S ...

- Hun karakteristieke kleur (gele kop, blauw lichaam, blauwe staart en zwarte tekening) onderscheidt hen direct van andere soorten van dit genus die allen een groene basiskleur hebben.
- Deze gekko's leven in bamboebossen. Ze gebruiken de bamboe ook om zich te verstoppen: bij gevaar kruipen ze snel naar de achterzijde van de bamboestengel waar ze snel naar boven of naar onder kunnen vluchten zonder gezien te worden, of ze verstoppen zich in de holle stengel van de bamboe.
- Phelsumas kunnen niet met de ogen te knipperen, daarom worden deze met hun tong gereinigd. In tegenstelling tot meeste andere overwegend nachtactieve gekkosoorten, hebben ze een ronde pupil zoals andere dagactieve dieren.

KENMERKEN

- Klasse: Reptielen
- Orde: Schubreptielen
- Familie: Gekko's
- Lengte: 9-10 cm, waarvan ongeveer de helft staart
- Gewicht: 5-6 g
- Max. leeftijd: 6-10 j

VERSPREIDINGSGEBIED KLEMMERS DAGGEKKO'S

ZOO ANTWERPEN

ZOO PLANCKENDAEL

VERSPREIDINGSGEBIED

Klemmers daggekko's komen enkel voor in noordwest Madagaskar: er is een populatie op het schiereiland Ampasindava en een andere in de buurt van het 600 km zuidelijker gelegen Mandrozomeer. Ondanks onderzoek in de gebieden ertussen zijn er geen dieren aangetroffen, blijkbaar zijn er dus 2 geïsoleerde populaties.

BIOTOOP

Deze daggekko leeft alleen in stukken bamboebos die gelegen zijn zowel in intacte wouden als in gedegradeerd woud. Ze zitten vooral op de gladde, gele bamboestengels van middelgrote tot volwassen of zelfs dode bamboe.

VOEDING

Ze eten vooral insecten en andere kleine ongewervelden, maar ook zoete vruchten en nectar.

VOORTPLANTING

De geslachten bij de Klemmers daggekko zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden.
Het voortplantingsseizoen loopt van september tot februari en in deze periode worden er ongeveer om de vier weken legsels geproduceerd. Vrouwtjes leggen per keer 2 eitjes, verstopt in de stengels van de bamboe.

De gekko's leggen de eieren met een harde schaal los op een beschutte plaats (zgn. vrijlegger). Na 40-50 dagen (afhankelijk van de temperatuur) komen de jongen uit. Bij hun geboorte zijn ze 22-29 mm groot, en volledig op zichzelf aangewezen.

BEDREIGD

De bamboebosjes waarin deze gekko's leven zijn bedreigd. Ze worden platgebrand om daarna te gebruiken als landbouwgrond.
Daarnaast is deze soort ook erg populair in de terrariumhandel; de soort werd daarom zowel lokaal beschermd als opgenomen in de CITES bijlage II/B en er worden ondertussen voornamelijk in gevangenschap gekweekte dieren verhandeld.

IUCN-status
BEDREIGD