LÉMUR NOIR

NOM NÉERLANDAIS
moormaki

NOM FRANÇAIS
lémur noir ou
lémur macaco

NOM ANGLAIS
black lemur

NOM SCIENTIFIQUE
Eulemur macaco

LES LÉMURS NOIRS ...

- ne meurent pas par empoisonnement des millepattes qu'ils mangent de temps en temps. Ils utilisent même le poison libéré par les millepattes pour en enduire leur pelage à des fins de défense. C'est un répulsif contre les insectes.
- portent un pelage gris-noir à la naissance. Les femelles virent au brun au bout de quelques semaines.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe: mammifères
- Ordre: primates
- Famille: lémuridés (makis)
- Longueur tête - tronc: 39 - 45 cm
- Poids: 1,9 - 2 kg
- Age maximum: en captivité environ 27 ans
- Longueur de la queue: 51 - 65 cm

AIRE DE RÉPARTITION

Le lémur noir vit au nord-ouest de Madagascar et dans les îles proches de Nosy Be et Nosy Komba.

BIOTOPE

Les lémurs noirs occupent la forêt équatoriale primaire et secondaire. Ils se rencontrent aussi dans les arbres de pépinières et zones agricoles où sont plantés des cacaoyers et des anacardiers.

AIRE DE RÉPARTITION DES LÉMURS NOIRS

ZOO ANTWERPEN

ZOO PLANCKENDAEL

RÉGIME ALIMENTAIRE

Les lémurs noirs se nourrissent aussi bien la nuit que le jour mais surtout au petit matin et en fin d'après-midi.
Ils concentrent leur recherche de nourriture dans la partie centrale et supérieure de la forêt tropicale.
Les fruits constituent la majeure partie de leur repas. Ils mangent également des jeunes pousses, fleurs, champignons et de temps en temps des invertébrés comme les millepattes.

En mangeant beaucoup de fruits, ces lémurs jouent un rôle important dans la dispersion des graines dans la forêt équatoriale. A la saison sèche, le nectar est aussi une de leurs sources d'alimentation.

Au ZOO Planckendael, ils reçoivent des légumes, un tout petit peu de fruits et des granulés pour singes.
Les lémurs ne reçoivent pas trop de fruits parce que ceux-ci sont cultivés et renferment donc trop de sucre. La composition des légumes correspond mieux à la composition de la nourriture qu'ils absorbent dans leur habitat.
Ils mangent suffisamment de fibres en grignotant des branches de saule.

Statut IUCN
VULNÉRABLE

MENACÉ

Les animaux sont menacés par la perte de leur habitat, la chasse (pour la viande et la fourrure) et le commerce illégal en animaux domestiques.

EEP

L'EEP est géré par le Zoo de Dudley, en Angleterre.
L'EEP ou European Endangered Species Programme est un programme d'élevage pour les espèces menacées appliqué dans les parcs zoologiques européens qui sont affiliés à l'association européenne des zoos et des aquariums, EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Un seul zoo coordonne le programme d'élevage.

REPRODUCTION

Ils atteignent leur maturité sexuelle à l'âge de deux ans.
La période d'accouplement est saisonnière et dépend de la quantité de lumière du jour. Elle se situe donc principalement entre fin avril et mai. Les mâles se battent entre eux pour obtenir les femelles fertiles.

Après une période de gestation d'environ 125 - 127 jours, 1 petit voit le jour, parfois des jumeaux. A la naissance, le petit s'agrippe fermement au ventre de sa maman. Au bout d'un mois, il lui grimpe sur le dos. Le sevrage a lieu à 6 - 7 mois.