



*Tajo woog 106 gram bij geboorte, Tinto maar 66 gram.
We vermoeden dat Tinto een meisje is.”* Verzorgster Charlotte

Ook bij de
chiliflamingo's
in ZOO Plancken-
dael lopen
kuikens rond.

Pril Cubaans flamingogeluk

ZOO Antwerpen en ZOO Planckendaal
brengen heel wat nieuw leven voort.
Elke keer weer zijn we vertederd. Nij ook?

ZOO
ANTWERPEN

FLAMINGO: Cubaanse flamingo, één van de zes soorten

ORDE: flamingo's, recent DNA-onderzoek toont verwantschap met de gans

LEEFGEBIED: zoutmeren in het zuidoosten van Noord-Amerika tot het noorden van Zuid-Amerika

AANTAL EIEREN: 1

BROEDTIJD: 27 tot 31 dagen

GEBOORTEGEWICHT: 50 à 100 gram tegenover 2 tot 4 kilo voor een volwassen dier

GROOTTE: 15 centimeter tegenover 120 tot 145 centimeter, de mannetjes zijn het grootst

GESLACHTSRIJP: na 3 jaar, als ze roze zijn

OUDERDOM: 30 jaar, +50 jaar in zoos

STATUS: niet bedreigd: meer dan 200 000 dieren, wel menselijke verstoring van broedgebied.

GRIJZE SUIKERSPINNEN

Het kleurrijke welkomstballet op het Flamingoplein groeit aan. Er zijn deze zomer twee grijze ballerina's bijgekomen. Tajo kwam op 28 juni uit het ei en Tinto brak op 16 juli de eierschaal. Wist je dat we zeggen dat de kuikens uit het ei kipten?

EEN EITJE!

In deze jonge groep vogels waren er dit jaar voor het eerst succesvolle broedsels. Twee van

WEETJE

De kniegewrichten zitten onder hun veren. Ze lopen eigenlijk op hun tenen.

De negen eieren bleken bevrucht. Om ze alle kansen te geven, legden we de eieren in de broedmachine en kregen de ouders een kalkei om op te broeden. Flamingo's maken modder-nesten, een meetlat hoog, om hun eieren te beschermen tegen overstromingen en de hitte vlakbij de grond. Ze broeden beurtelings op het witte, fragiele ei. Na het kippen wisselden we de kalkeieren met de kuikens. En het ging goed! Zo goed dat er voor Tinto zelfs drie dieren een ouderrol aannamen, en hij al snel in de vijver ging zwemmen.

Na een paar dagen gooide een meeuw echter roet in het eten. Ze verstoorde het tweede gezin zodat Tinto te vroeg op eigen pootjes kwam te staan. Onze verzorgers namen de zorg gelukkig snel over. Ze gaven het kuikentje tot vijfmaal per dag een spuitje met speciale, door de dierenarts samengestelde pap. Flamingo's hebben, net als duiven, een kropklier om hun jongen vette melk te voeden. Na twee maanden eten de kuikens zelfstandig en zeven ze instinctief voedingsstoffen uit het water. Ze houden hiervoor hun snavel ondersteboven. Ook Tinto had snel de slag te pakken. Onze flamingo's eten korrels waarin de natuurlijke roze kleurstof zit. In de natuur eten ze waterdiertjes zoals zoutkreeftjes en algen met dezelfde kleurstof.

WEETJE

De kniegewrichten zitten onder hun veren. Ze lopen eigenlijk op hun tenen.

de negen eieren bleken bevrucht. Om ze alle kansen te geven, legden we de eieren in de broedmachine en kregen de ouders een kalkei om op te broeden. Flamingo's maken modder-nesten, een meetlat hoog, om hun eieren te beschermen tegen overstromingen en de hitte vlakbij de grond. Ze broeden beurtelings op het witte, fragiele ei. Na het kippen wisselden we de kalkeieren met de kuikens. En het ging goed! Zo goed dat er voor Tinto zelfs drie dieren een ouderrol aannamen, en hij al snel in de vijver ging zwemmen.

INCIDENT

Na een paar dagen gooide een meeuw echter roet in het eten. Ze verstoorde het tweede gezin zodat Tinto te vroeg op eigen pootjes kwam te staan. Onze verzorgers namen de zorg gelukkig snel over. Ze gaven het kuikentje tot vijfmaal per dag een spuitje met speciale, door de dierenarts samengestelde pap. Flamingo's hebben, net als duiven, een kropklier om hun jongen vette melk te voeden. Na twee maanden eten de kuikens zelfstandig en zeven ze instinctief voedingsstoffen uit het water. Ze houden hiervoor hun snavel ondersteboven. Ook Tinto had snel de slag te pakken. Onze flamingo's eten korrels waarin de natuurlijke roze kleurstof zit. In de natuur eten ze waterdiertjes zoals zoutkreeftjes en algen met dezelfde kleurstof.