

De l'œuf au manchot : bébés manchots du Cap au ZOO



Chaque jour, la petite plage de la Rotonde est joyeusement animée. Une trentaine de manchots du Cap vivent ici et se prélassent dehors tous ensemble, du moins s'ils n'ont pas d'œufs à couvrir ou de poussins à dorloter.



❶ Le soir, chaque petit couple rejoint son nichoir. En général, les manchots restent ensemble pour la vie et sont fidèles à leur nid. Ils sont assez romantiques.



❷ Après le repas, les manchots 'papotent' avec leur partenaire. Ou ils se mordillent la nuque, ou se lissent mutuellement les plumes après avoir nagé. Trop mignon à voir !



❸ La femelle pond deux œufs. Mâle et femelle se relayent dans le nid pour permettre à l'autre d'aller chercher à manger. Cela peut parfois prendre deux jours.

Durant la période de couvaison, au printemps et à l'automne, les manchots se font la cour en paradant. Ils se tiennent bien droit, la tête relevée. Et ils font un de ces tintamarres ! Ils braient comme des ânes. Soigneuse Yasmine

BON À SAVOIR

❶ Dès que le sexe est connu, l'oisillon reçoit une puce avec un numéro et un bracelet de couleur : les filles à l'aile gauche, les garçons à l'aide droite. À chaque année sa couleur. Une autre couleur renvoie aux parents. Donc chaque manchot a son propre code de couleurs. Les soigneurs savent ainsi exactement qui est qui.



4 Les soigneurs contrôlent les nicheris par une petite porte arrière. Les œufs sont tenus au chaud sous les parents. Lors de la couvaison, les manchots font tourner et glisser l'œuf pour que le poussin grandisse bien.

5 Les soigneurs emportent deux fois l'œuf pour l'éclairer. Ils voient ainsi s'il est fécondé et/ou s'il évolue bien.



6 Dès qu'un trou apparaît, après environ 38 jours de couvaison, les soigneurs savent que l'œuf va éclore le lendemain.

7 Dès qu'il sort de l'œuf, l'oisillon piaille. C'est important car s'il ne piaille pas, les parents ne le nourriront pas.

8 Les manchots ne se laissent pas aisément prendre leur petit. Les soigneurs se protègent les mains avec des gants très épais.



9 Les parents régurgitent une partie du poisson consommé dans le petit bec de leur oisillon.

10 Après deux mois, le poussin perd son duvet et quitte le nid. Le vétérinaire lui injecte alors une puce.

Les manchots du Cap

sont les seuls manchots vivant en Afrique,

sur la côte d'Afrique du Sud et de Namibie. Ils sont menacés par la surpêche et la pollution pétrolière.

La KMDA soutient un projet africain prenant soin des poussins malades, blessés ou abandonnés de manchots du Cap et d'autres oiseaux marins vulnérables.