

TORTUE-BOÎTE DE MALAISIE



NOM NÉERLANDAIS
Ambonese doosschildpad

NOM FRANÇAIS
Tortue-boîte de Malaisie

NOM ANGLAIS
Southeast asian box turtle

NOM SCIENTIFIQUE
Cuora amboinensis

TORTUE-BOÎTE DE MALAISIE ...

- Toutes les tortues du genre Cuora ont une carapace à charnière ventrale qu'elles peuvent donc fermer entièrement en cas de danger. Elles forment une petite boîte fermée, empêchant l'agresseur d'accéder à une zone délicate de l'animal. D'où le nom de tortue-boîte.
- Ce sont de vraies tortues marécageuses, totalement adaptées à la vie aquatique, avec des pattes rameuses aplaties latéralement et des palmures entre les doigts de pied. Elles aiment surtout les eaux stagnantes peu profondes.
- Elles sont facilement identifiables à leurs traits jaunes caractéristiques sur la tête.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe : Reptiles
- Ordre : Tortues
- Famille : Geoemydidae
- Longueur de la carapace : 20 - 25cm
- Poids : Jusqu'à près de 2 kg (mâles un peu plus grands et lourds que les femelles)
- Âge maximum : Âge maximum peuvent vivre jusqu'à 38 ans.

AIRE DE RÉPARTITION

L'espèce se rencontre dans une grande partie de l'Asie du sud-est : des îles Nicobar en passant par l'est de l'Inde (Assam), le Bangladesh, le Bhoutan, Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Viêt Nam central et du sud, la Malaisie occidentale, Singapour, plusieurs îles des Philippines et d'Indonésie (e.a. Ambon, dont cette espèce porte le nom). Dans cette grande aire de répartition, on connaît 4 sous-espèces différentes.





BIOTOPE

Les jeunes individus sont entièrement aquatiques, ils vivent dans des eaux stagnantes telles que des marais, étangs, mares, rizières, .. dans les régions tropicales humides. Les adultes restent fortement liés à l'eau mais évoluent plus sur la terre ferme (certes, toujours à proximité d'un point d'eau).

RÉGIME ALIMENTAIRE

Omnivores : ils mangent quasi autant de nourriture végétale qu'animale (plantes marécageuses et aquatiques, occasionnellement des fruits, des invertébrés comme des vers de terre, mollusques et parfois du poisson).

REPRODUCTION

Les femelles sont plus bombées, un peu plus grandes et rondes que les mâles et portent un plastron plat. Les mâles adultes ont un plastron creux pour faciliter l'accouplement avec la femelle. Les mâles ont aussi une plus longue queue que les femelles, plus épaisse à la base. Ils atteignent leur maturité sexuelle à l'âge de 4 ou 5 ans. Lors de l'accouplement, le mâle mord le cou de la femelle, laquelle présente souvent des morsures ou cicatrices dans la région cervicale. Les femelles creusent un trou pour déposer 1 à 5 œufs ronds (généralement 2 ou 3). Les œufs éclosent après 60 - 85 jours. Une fois sortis, les jeunes doivent se débrouiller seuls ; les parents ne s'en occupent pas. En raison du climat chaud permanent, cette tortue peut pondre plusieurs fois par an.

MENACÉ

L'espèce est menacée dans une grande partie de son aire de répartition, essentiellement par la chasse pour la consommation humaine. Par ailleurs, elle est aussi utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise et est en vogue dans le commerce de terrariums.

Statut IUCN
VULNÉRABLE

