

BEVERRAT



NEDERLANDSE NAAM

Beverrat

FRANSE NAAM

Ragondin

ENGELSE NAAM

Nutria

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Myocastor coypus

BEVERRATTEN ...

- zijn **nachtdieren**.
- leven in paren of in kleine familiegroepen tot 12 dieren.
- leven in zelfgebouwde **burchten** op de oevers van rivieren en meren.
- zijn goede zwemmers en kunnen 10 minuten onder water blijven. De tenen van hun achterpoten zijn verbonden door zwemvliezen.

KENMERKEN

- | | |
|-------------------|---|
| • Klasse: | zoogdieren |
| • Orde: | knaagdieren |
| • Familie: | beverratten |
| • Lichaamslengte: | 47 - 57 cm |
| | Het mannetje is groter dan het vrouwtje |
| • Gewicht: | 5 - 10 kg |
| • Staartlengte: | 34 - 40 cm |
| • Max. leeftijd: | 6 jaar in het wild
tot 12 jaar in dierentuinen |

VERSPREIDINGSGEBIED

Inheems in Zuid-Amerika; door ontsnappingen uit pelskwekerijen ook te vinden in Europa, Azië en Noord-Amerika.

BIOTOOP

Moerassen, oevers, bos; altijd in de nabijheid van water.



VERSPREIDINGSGEBIED BEVERRATTEN



VOEDING

Planteneters: (water)planten, twijgen.

VOORTPLANTING

Beverratten zijn vruchtbaar vanaf 6 maanden. Na een draagtijd van 127 tot 139 dagen krijgt het vrouwtje 1 tot 12 jongen (gemiddeld 6). Het vrouwtje heeft 4 paar tepels.

Bij geboorte hebben de jongen hun oogjes al open en zijn ze volledig behaard. De zoogperiode duurt 8 weken.