

JAMAICABOA



NEDERLANDSE NAAM

Jamaicaboa

FRANSE NAAM

Boa de la Jamaïque

ENGELSE NAAM

Jamaican boa

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Chilabothrus subflavus

JAMAICABOA'S ...

- Jamaicaboa's zijn voornamelijk nachttactief; overdag verschuilen ze zich meestal in de dichte plantengroei of in een holte.
- Ze zoeken hun prooi met behulp van hun gevorkte tong waarmee ze hun prooi kunnen "ruiken". Vanuit een hinderlaag slaan ze dan bliksemsnel toe. De prooi wordt gedood door wurging en dan zoals bij alle slangen in zijn geheel opgegeten, de kop eerst.
- In Jamaica wordt deze slang ook "yellow snake" of "gele slang" genoemd vanwege zijn kleur: vooraan is de slang geel, verder naar achter toe komen er zwarte banden die geleidelijk overgaan in volledig zwart zodat het achterlichaam en de staart zwart zijn.
- Vanwege hun bedreigde status is een internationaal kweekprogramma opgezet door de Europese dierentuinen waaraan Zoo Antwerpen actief meewerkt.

KENMERKEN

- | | |
|-----------------|----------------|
| • Klasse: | Reptielen |
| • Orde: | Schubreptielen |
| • Familie: | Schubreptielen |
| • Lengte: | tot 2.3 m |
| • Gewicht: | tot 5 kg |
| • Max. leeftijd | tot 20 j |

VERSPREIDINGSGEBIED

De jamaicaboa's komen enkel voor op Jamaica (inclusief op Goat Island).





BIOTOOP

Jamaicaboa's leven vooral in de tropische regenwouden en moerasgebieden van het eiland, maar worden ook aangetroffen in de drogere bossen aan de zuidkust.

Ze houden zich voornamelijk op in bomen en struiken, bij voorkeur in gebieden zonder menselijke invloeden. Maar door verlies van woongebied worden de slangen ook in andere gebieden aangetroffen.

VOEDING

Deze boa voedt zich met ratten, vogels, hagedissen en andere kleinere dieren zoals vleermuizen, padden en insecten.

VOORTPLANTING

Jamaicaboa's zijn ovovivipaar. Dat wil zeggen dat de vrouwtjes geen eieren leggen, maar dat de eieren zich in het lichaam van het vrouwtje ontwikkelen en er levende jongen geboren worden. Na een ontwikkelingsperiode (incubatietijd) van 6 à 7 maanden worden 3 tot meer dan 40 jongen geboren. Bij de geboorte is een jong zo'n 50 cm lang en weegt 15 gram.

BEDREIGD

Er zijn verschillende bedreigingen voor deze slangensoort.

Eenzijds is er de ontbossing voor landbouw, bewoning en andere menselijke activiteiten. Ook het afbranden van suikerrietvelden veroorzaakt sterfte.

Daarnaast is er ook een grote impact van door de mens geïntroduceerde soorten zoals honden, katten en mangoesten. Deze laatste werden geïntroduceerd om de ratenplaag in de suikerrietvelden te bestrijden. Ze hadden effectief een impact op de rattenpopulaties, maar helaas ook op heel wat inheemse soorten reptielen en vogels. Zo

ging ook het aantal jamaicaboa's sterk achteruit doordat de mangoesten de jonge slangen opaten. Ondertussen is de jamaicaboa, samen met vele andere inheemse soorten bedreigd.

De lokale bevolking bejaagt bovendien deze slang actief, vanwege de misvatting dat ze gevaarlijk en giftig is.

EEP

Het EEP wordt beheerd door het Natuurhistorisch museum en vivarium in Doornik (België).

Het EEP of European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het kweekprogramma.



IUCN-status
KWETSBAAR