LANGUR NOIR

NOM NÉERLANDAIS
Javaanse langoer

NOM FRANÇAIS
Langur noir

NOM ANGLAIS
Javan langur

NOM SCIENTIFIQUE
Trachypithecus auratus

LES LANGURS NOIR ...
- vivent en groupes, composés en moyenne de 7 à 9 individus. Il s'agit généralement d'un mâle et de plusieurs femelles.
- à la naissance, le petit est de couleur orange (le visage, les mains et les pattes sont plus pâles).

CARACTÉRISTIQUES
- Classe: mammifères
- Ordre: primates
- Famille: cercopithécidés
- Longueur tête-tronc: 44 - 65 cm
- Longueur de la queue: 61 - 87 cm
- Poids: ± 7 kg

AIRE DE RÉPARTITION
Le langur noir se rencontre en Indonésie (Java, Bali, Kalimantan et Sumtara).

BIOTOPE
Ces langurs se rencontrent surtout dans les plantations de teck, les mangroves, les forêts de feuillus et les forêts marécageuses.

AIRE DE RÉPARTITION LANGUR NOIR

ZOO ANTWERPEN

ZOO PLANCKENDAEL

RÉGIME ALIMENTAIRE

Les langurs se nourrissent de feuilles, de fruits, de fleurs et d'insectes.

REPRODUCTION

Le langur noir met généralement 1 petit au monde après une gestation de ± 170 jours.

MENACÉ

D'une part, les langurs perdent leur biotope au profit de l'expansion des zones agricoles. D'autre part, ils sont chassés en tant que source alimentaire, mais aussi pour le commerce d'animaux domestiques.

EEP

L'EEP est géré par Apenheul (Pays-Bas).
L'EEP ou European Endangered Species Programme est un programme d'élevage pour les espèces menacées, appliqué dans les parcs zoologiques européens qui sont affiliés à l'association européenne des zoos et des aquariums, EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Un seul zoo coordonne le programme d'élevage.