

KAAPSE BUFFEL



NEDERLANDSE NAAM

Kaapse buffel

FRANSE NAAM

Buffle d'Afrique

ENGELSE NAAM

Cape buffalo

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Syncerus caffer caffer

KAAPSE BUFFELS...

- leven in **kuddes van soms meer dan 1000 dieren**. Die kuddes bestaan uit verschillende clans waarin alle dieren aan elkaar verwant zijn. Mannetjes leven buiten het paarseizoen in eigen groepjes maar wel in contact met de grote kudde.
- vormen, als ze belaagd worden, een onneembare muur ter bescherming van de kalveren.
- blijven, als ze vluchten, heel dicht bij elkaar zodat het onmogelijk wordt voor een roofdier om een dier van de groep af te scheiden.

KENMERKEN

- Klasse: zoogdieren
- Orde: evenhoevigen
- Familie: holhoornigen
- Kop-romplengte: 2,1 - 3,4 m
- Schofthoogte: 1,3 - 1,7 m
- Gewicht: ♂ tot 900 kg
♀ tot 500 kg
- Max. leeftijd: 20 jaar in het wild, 30 jaar in dierentuinen
- Lengte staart: 75 - 110 cm
- Spanwijdte hoorns: tot 130 cm

VERSPREIDINGSGEBIED

Oost- en zuidelijk Afrika ten zuiden van de Sahara

BIOTOOP

Savannes, grasland



VERSPREIDINGSGEBIED KAAPSE BUFFEL



VOEDING

Een Kaapse buffel is een **planteneter** (en herkauwer) dus eet vooral gras, soms ook kruidachtige planten, bladeren en jonge loten.

VOORTPLANTING

Paartijd: hele jaar door, maar vooral tegen het einde van het regenseizoen. Kaapse buffels zijn geslachtsrijp na 3 à 4 jaar.

De draagtijd bedraagt 300 à 340 dagen. Jongen worden in het regenseizoen geboren. Aantal jongen per worp 1, soms 2 en de jongen wegen bij geboorte gemiddeld 40 kg. Na gemiddeld 9 maanden is het jong gespeend, vanaf zijn tweede maand begint het gras te eten.

BEDREIGING

Runderpest blijft een probleem en leidde in het verleden tot lokale uitsterving.

Tbc komt regelmatig voor; de bacil wordt vlot doorgegeven aan andere dieren van de kudde.

Zijn voornaamste vijanden zijn leeuwen, luipaarden, hyena's, Afrikaanse wilde honden en de mens.

