

BOA ARBORICOLE DE MADAGASCAR



NOM NÉERLANDAIS
Madagaskarhondskopboa

NOM FRANÇAIS
Boa arboricole de Madagascar

NOM ANGLAIS
Madagascar tree boa

NOM SCIENTIFIQUE
Sanzinia madagascariensis

BOA ARBORICOLE DE MADAGASCAR ...

- Vu leur capacité à s'adapter à des environnements et conditions de vie très différentes, leur taille peut fortement varier. Dans certaines régions, les spécimens adultes mesurent environ 150 cm tandis que d'autres peuvent mesurer jusqu'à 250 cm. Les femelles sont généralement plus grandes que les mâles.
- La couleur des adultes diffère aussi dans les différents habitats. Dans le nord-est de Madagascar, les serpents varient du vert foncé au bleu turquoise. Dans le sud-ouest, ils sont plutôt beige-brun. Les jeunes sont toujours rougeâtres.
- Les boas arboricoles de Madagascar sont principalement nocturnes.
- Tout comme les autres boas et pythons, ces serpents ont des "ergots" saillants de chaque côté du cloaque. Il s'agit en fait de vestiges du bassin, ce qui démontre que les serpents descendent des reptiles à quatre pattes. Les deux sexes ont des ergots, mais chez les mâles, ils sont généralement plus grands et plus pointus que chez les femelles.

CARACTÉRISTIQUES

- | | |
|-----------------|----------------|
| • Classe : | Reptiles |
| • Ordre : | Sauriens |
| • Famille : | Boidés |
| • Longueur : | 1,5 – 2,5m |
| • Poids : | 2 – 6 kg |
| • Âge maximum : | jusqu'à 20 ans |

AIRE DE RÉPARTITION

Le boa arboricole de Madagascar se rencontre à Madagascar.





BIOTOPE

Ils sont principalement présents du niveau de la mer jusqu'à 1300 m d'altitude, aussi bien dans des forêts intactes que dans celles dégradées par l'homme. Ces boas se rencontrent aussi dans les plantations et à proximité d'installations humaines. Ils peuvent survivre dans d'autres biotopes que les forêts tels que des steppes arides ou des régions montagneuses plus froides. Les boas arboricoles de Madagascar sont de bons grimpeurs et vivent surtout dans les arbres et arbustes mais chassent aussi des proies au sol.

RÉGIME ALIMENTAIRE

Les boas arboricoles de Madagascar mangent surtout des petits mammifères, mais aussi des oiseaux et grenouilles quand ils en trouvent. Ils peuvent localiser leur proie à l'aide d'organes thermosensibles situés sur la tête, visibles sous la forme de fossettes de chaque côté de la tête. Ceux-ci leur permettent de percevoir le rayonnement infrarouge et ainsi de "voir" leur proie, même dans l'obscurité totale, du moins si elle est à sang chaud.

REPRODUCTION

La femelle ne pond pas d'œufs. Les œufs fécondés se développent dans son corps pendant 6 à 8 mois et lorsqu'ils éclosent, elle met bas des jeunes vivants. En général, on compte 4 à 6 jeunes, mais cela peut monter à 16. Il n'y a pas de placenta comme chez les mammifères. Les jeunes se nourrissent du jaune d'œuf. En langage scientifique, on dit que le boa arboricole de Madagascar est ovovivipare.

Tous les jeunes sont de couleur rouge-orange et vivent exclusivement dans les arbres et buissons. Ils ne prennent leur couleur définitive qu'une fois adultes.

EEP

L'EEP est géré par le zoo de Varsovie (Pologne).

L'EEP ou European Endangered Species Programme est un programme d'élevage pour les espèces menacées, appliqué dans les parcs zoologiques européens qui sont affiliés à l'association européenne des zoos et des aquariums, EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Un seul zoo coordonne le programme d'élevage.

