

STOKSTAARTJE



NEDERLANDSE NAAM
Stokstaartje

FRANSE NAAM
Suricate

ENGELSE NAAM
Slender-tailed meerkat

**WETENSCHAPPELIJKE
NAAM**
Suricata suricatta

STOKSTAARTJES ...

- gaan op **voedseljacht in groep**. Sommige dieren houden dan de wacht op bijvoorbeeld een termietenheuvel of in de takken van struikjes. Ze kijken vooral uit naar roofvogels. De schildwachten waarschuwen bij gevaar hun groepsleden door fluitende of klokkende geluiden te maken. Scherpe blafjes of bromgeluiden betekenen 'groot gevaar'. De stokstaartjes reageren hierop en duiken onmiddellijk onder de grond. Ze werken ook samen om vijanden te verjagen.
- kunnen, net zoals alle leden van de familie van mangoesten, over het algemeen beter tegen gif van **slangen en schorpioenen** dan andere dieren. Dit komt omdat ze net iets andere soorten neurotransmitters hebben dan andere dieren, waardoor het gif geen spierverlamming kan veroorzaken. Maar als een stokstaartje meerdere malen door een giftige slang of schorpioen wordt gebeten kan het hier wel door sterven. Toch eten ze graag schorpioenen en slangen. Ze vangen deze vaak met een groepje. Alle stokstaartjes gaan dan om de schorpioen of slang heen staan, zodat deze ze niet allemaal kan zien en niet allemaal tegelijk kan aanvallen. Een van de stokstaartjes bijt dan razendsnel de giftige punt van

de 'staart' van de schorpioen af. Daarna verwijderen ze alle giftige delen en smeren de giftige buitenste laag van het exoskelet af aan de grond alvorens de schorpioen te verorberen. Ook slangen worden op deze manier bejaagd.

KENMERKEN

- **Klasse:** zoogdieren
- **Orde:** carnivoren (roofdieren)
- **Familie:** mangoesten
- **Kopromplengte:** 250 - 350 mm
- **Staartlengte:** 175 - 250 mm
- **Gewicht:** 620 - 970 g
- **Max. leeftijd:** tot 15 jaar, in dierentuinen tot 17 jaar

VERSPREIDINGSGEBIED

Stokstaartjes komen voor in zuidelijk Afrika

BIOTOOP

Ze leven in droge open gebieden.



VERSPREIDINGSGEBIED STOKSTAARTJES

VOEDING

Stokstaartjes gebruiken hun **lange voorklauwen** om hopen te graven en voedsel te zoeken. Ze eten vooral insecten, spinnen en ander klein gedierte. Maar ze graven ook wortels en knollen op. Eieren van vogels en reptielen staan ook op hun menu. Je kan de stokstaartjes als alleseters beschouwen.

VOORTPLANTING

Stokstaartjes leven in sociale groepen. Deze groep bestaat meestal uit 4 tot 9 dieren maar er zijn ook groepen gemeld van 49 individuen. Elke groep heeft één dominant paar, alleen het alfavrouwkje wordt drachtig.

♂ en ♀ zijn geslachtsrijp vanaf 1 jaar.

De draagtijd bedraagt 11 weken. Er worden 3 à 4 jongen geboren.

Eén of meer volwassenen passen op de kleintjes terwijl de anderen op jacht zijn. 'Babysitters' blijven dicht bij de onderaardse hopen, zodat ze de kleintjes eventueel snel in veiligheid kunnen brengen. De jongen worden gespeend als ze 49 tot 63 dagen oud zijn.

