WRATTENZWIJN

NEDERLANDSE NAAM
Wrattenzwijn

FRANSE NAAM
Phacochère d'Afrique

ENGELSE NAAM
Common warthhog

WETENSCHAPPELIJKE NAAM
Phacochoerus africanus

WRATTENZWIJN ...
- Heeft meerdere bulten op zijn gezicht, waaraan hij zijn naam heeft te danken. Deze bulten zijn echter geen wratten, maar eerder kussentjes. Deze helpen om hem te beschermen in gevechten.
- Slaapt in kuilen. Hij gebruikt kuilen die andere dieren hebben gegraven. Hij gaat hier achterwaarts in, zodat hij de omgeving nog wel in de gaten kan houden.

KENMERKEN
- Klasse: Zoogdieren
- Orde: Evenhoevigen
- Familie: Varkens
- Kop-romplengte: 105 - 150 cm
- Gewicht: 50 - 150 kg
- Staartlengte: 35 tot 50 cm
- Max. leeftijd: ±18 jaar

VERSPREIDINGSGEBIED
Het wrattenzwijn komt in centraal en zuidelijk Afrika voor.

BIOTOOP
Het leeft hier in open graslanden, savannes en tussen struikgewassen.

VERSPREIDINGSGEBIED WRATTENZWIJN

ZOO ANTWERPEN

ZOO PLANCKENDAEL

VOEDING

Het wrattenzwijn voedt zicht met grassen, wortels en vruchten.

VOORTPLANTING

De draagtijd van een wrattenzwijn duurt 160 tot 170 dagen. Een worp kan bestaan uit 1 tot 8 jongen.

BEDREIGD

Het wrattenzwijn heeft de status “niet bedreigd”. Dit komt door de weide verspreiding en snelle voortplanting.

EEP

Het EEP (European Ex-situ Program) wordt beheerd door het Flamingo Land Resort (VK).